



COLONOSCOPIA diagnóstica y terapéutica

La colonoscopia es el examen visual del interior de su intestino grueso o colon. El procedimiento se realiza de forma ambulatoria bajo sedación consciente o con una internación breve bajo anestesia general. Por ello tendrá que venir acompañado, no conducir vehículos o no operar maquinarias ni tomar decisiones legales ni realizar tareas intelectuales posteriores al estudio.

En las consultas previas el médico le solicitará que efectúe algunos análisis previos y que sea evaluado por el cardiólogo. Usted debe decir si presenta otras enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, alergias o reacciones a los medicamentos, insuficiencia renal, etc. Le explicará la exploración y responderá a sus preguntas, pidiéndole que firme una autorización para que se realice la endoscopia y los tratamientos que de ella se pueden derivar.

El día anterior al estudio deberá prepararse adecuadamente (ver instructivo adjunto) Sin esta limpieza del intestino es imposible efectuarlo, ya que para tener una buena visión, el colon debe estar completamente limpio y libre de materia fecal. Las mujeres concurrirán con las uñas sin esmalte porque interfiere con el monitoreo de oxígeno digital. El día de la exploración se le pedirá que se ponga una bata, se quite la ropa interior y entregue a su acompañante los anteojos, lentes de contacto, dinero, joyas o dentaduras postizas. Se le colocará en una postura adecuada y cómoda, y se le colocará suero para administrarle medicación a través de la vena y dar comienzo a la anestesia (en quirófano central con propofol) o sedación (con midazolam) o a la sedación consciente (con midazolam y fentanilo). Tachar lo que no corresponda.

El endoscopista le introducirá un largo tubo flexible iluminado a través del arlo y del recto. Por medio de esta sonda óptica podrá ver anomalías del intestino y si es necesario en el curso de la exploración tomará pequeñas muestras de tejido (biopsias) para su análisis microscópico. También podrá realizar algunos tratamientos como por ejemplo, extirpar pólipos mediante un lazo metálico por donde se hace pasar una corriente eléctrica.

Después del procedimiento permanecerá usted durante un periodo de hasta una o dos horas, mientras desaparecen los efectos de la medicación suministrada.

Deberá alguien acompañarlo a su domicilio ya que la sedación puede afectar sus reflejos y su capacidad de juicio. La distensión abdominal persiste después del examen hasta que se elimina el aire insuflado, puede producir molestias leves.

La colonoscopia tiene eventuales riesgos, y aunque las complicaciones son muy raras, (0,3 %) usted debe saber que puede haber reacciones a los medicamentos, no detectar lesiones pequeñas, perforación del intestino u hemorragias que requieran tratamiento urgente o incluso una operación inmediata. Los riesgos de perforación y sangrado están incrementados si se extirpan pólipos (2,3%). No dude en comunicar si tiene dolor abdominal intenso o hemorragias persistentes en las horas o días siguientes al estudio. Por ello es que deberá dar su permiso por escrito para efectuar este procedimiento endoscópico. Si se realiza mucossectomía el porcentaje de complicaciones es similar, pero la posibilidad de recidiva de la lesión es de 2.3 a 35%.

El presente documento me ha sido entregado por el Dr/Dra. para ser llevado a mi domicilio a fin de tener la oportunidad de comprenderme debidamente del mismo.

He comprendido la información que me ha sido proporcionada y asimismo, me han dado la oportunidad de hacer preguntas, y todas mis preguntas fueron contestadas completa y satisfactoriamente.

Declaro que todos los espacios en blanco en este documento fueron llenados o se han tachado antes de yo firmarlo, y confirmando que se han comprendido perfectamente lo anteriormente expuesto, expreso mi

CONSENTIMIENTO.

Fecha: ____/____/____

Por la presente, yo _____ de nacionalidad _____ de estado civil _____ domiciliado/a en la calle _____ piso _____ departamento _____

de la localidad de _____.