

## FOSFO-DOM KIT | Preparación para estudios por la mañana

### PREPARACION DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS, ENDOSCOPICOS, Y CIRUGIA DE COLON CON FOSFO-DOM KIT (EXAMENES A REALIZAR ENTRE LAS 8 Y 12 HS)

Debe tenerse en cuenta que el buen resultado de su estudio está condicionado al estricto cumplimiento de las instrucciones que se detallan a continuación

#### DÍA PREVIO AL EXAMEN

Evitar frutas, verduras y lácteos. Tomar abundantes líquidos claros no gasificados (agua mineral, jugo tipo gatorade de pomelo, caldos colados, jugos colados, mate, té).

**13 hs Almuerzo.** Carnes rojas o blancas solas. Gelatina de frutas (**esta es la última comida sólida antes del examen**).

**17 hs.** Diluir en un vaso de agua fría o jugo tipo gatorade de pomelo frío (250 c.c.), el contenido de un envase de **FOSFO-DOM (45 c.c.)**. A continuación tomar dos vasos de agua o jugo tipo gatorade de pomelo bien fríos.

**ENTRE LA TOMA DE FOSFO-DOM Y LOS COMPRIMIDOS DE Bisacodilo Domínguez (a las 22 HS) USTED DEBERA INGERIR POR LO MENOS UN LITRO DE AGUA O LIQUIDOS CLAROS NO GASIFICADOS**

**22 hs.** Tomar los 4 comprimidos de **Bisacodilo Domínguez** con un vaso de agua sin masticarlos.

A continuación tomar dos vasos de agua o jugo tipo gatorade de pomelo. Puede ingerir la cantidad que desee de líquidos claros no gasificados (agua mineral, jugo tipo gatorade de pomelo, caldos colados, jugos colados, mate, té) hasta 3 hs antes del examen.

#### DÍA DEL EXAMEN

Puede ingerir la cantidad que desee de líquidos claros no gasificados hasta 2 hs. antes del examen. **LUEGO SUSPENDER TODA INGESTA ORAL ANTES DEL PROCEDIMIENTO.**

Una hora antes de concurrir a su examen deberá colocarse el supositorio de **Bisacodilo Domínguez**, retenerlo diez minutos y evacuar.

**Recuerde que durante las dos horas previas a su examen no deberá ingerir nada por boca.**



**LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.** Para esta preparación debe tenerse en cuenta que si usted padece de diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, está embarazada o cree estarlo, debe consultar previamente con su médico. Para este estudio usted necesitará un envase de FOSFO-DOM KIT.